

Zápis ze zasedání Pracovní skupiny pro dermatologickou alergologii a profesionální dermatózy konaného dne 10.10.2025 v knihovně Dermatovenerologické kliniky VFN v Praze.

Schůzi řídil MUDr. Martin Novák

Přítomni: dr. Žemličková, dr. Vocilková, dr. Řehoř, dr. Višatová, dr. Janatová, prim. Jandová, dr. Vavříková, prim. Němcová, dr. Hromádková, dr. Poslíšilová, dr. Fenclová, dr. Reslová, dr. Stumpfová, dr. Kezníkl, dr. Šícha

Omluveni: doc. Dastychová, dr. Karlová, dr. Košťálová

Termín dalšího zasedání byl stanoven na 6.2.2026

- Dr. Kezníkl představil nového kolegu dermatologa MUDr. Martina Šíchu, který pracuje na kožním oddělení v Chomutově a bude se věnovat vyšetřování profesionálních dermatóz
- Dr. Novák přečetl zápis z minulého zasedání, kde byly řešeny i dva klinické případy. V obou případech nemocní změnili pracovní zařazení a neměli zájem o případné další šetření profesionality.
- V rámci diskuse dr. Janatová vznesla dotaz ohledně dobodování ZSU – tato problematika byla probírána i na předchozím zasedání, k čemuž se vyjádřila i tentokrát as. Fenclová.
- Dr. Pospíšilová zmínila dosud vyšetřovanou pacientku atopičku s pozitivní alergií na nikl, kobalt a DESAM Efekt s nálezem na rukou a postupnou diseminací. Nemocná pracuje na dvou pracovištích, a tak je třeba též rozhodnout na jakém pracovišti se přítomnost alergenů bude šetřit.
- Dr. Novák se pozastavil nad kvalitou některých závěrů hygienických šetření v poslední době (vedl příklad hygienického šetření u svrabu, kde byla řada faktických chyb i terminologických nepřesností a ve spolupráci s KPL žádal opravu, která byla provedena). Dr. Fenclová dodala, že i jejich pracoviště se potýká se zhoršenou úrovní práce KHS v řadě směrů. Při této příležitosti dr. Novák uvedl v rámci diskuse zatím předběžný závěr hygienického závěru, kde u pacienta s pozitivní alergickou reakcí na epoxy-pryskyřice +++ s odpovídajícím klinickým nálezem ekzému na nekrytých částech těla a opakovaně pozitivním reexpozičním / eliminačním testem, kde KHS „nenašla“ na pracovišti epoxidy (o hygienické šetření bylo žádáno v lednu 2025, hygienik šetření provedl až v září 2025!!), ač se epoxidy na příslušném pracovišti používají. KPL navrhuje překlasifikování na iritační dermatitidu, což pracovní skupina považuje za nešťastné řešení a spíše doporučuje poučit personál KHS o charakteru alergenů, který působí též aerogenně atd ...
- Na dotaz dr. Vocilkové, zda může být onemocnění přenosné a parazitární hlášeno na základě vyšetření praktického lékaře dr. Fenclová upozornila, že je vždy nutné dermatologické vyšetření, vyšetření praktickým lékařem nestačí. Bylo též upozorněno na možnost diagnostiky svrabu pomocí dermatoskopu (resp. Viziomedu), a to zejména u těžkých forem (např. scabies norvegica). Dr. Novák upozornil, že na kožní klinice v Plzni jsou běžně dělána vyšetření na scabies v louhovém preparátu.

Přestože výtěžnost vyšetření lze odhadnout na cca 20%, je toto vyšetření užitečné pro potvrzení diagnózy a nemělo by být opomíjeno, stejně tak jako i v rámci mykologického vyšetření. Je levný a pomůže stanovit diagnózu takřka ihned. Též uvedl případ pacientky s těžkou AD léčenou lebrikizumabem, kde právě u podezřelého a zdánlivě refrakterního klinického nálezu pozitivita louhového preparátu (nález *S. scabiei*) diagnózu scabies s jistotou potvrdila a po antiskabiézní léčbě sirnou mastí se kožní nález dramaticky zlepšil a je úspěšně pokračováno v zahájené biologické léčbě AD. Prim. Jandová v této souvislosti uvedla zkušenost z Hradce Králové, že zaznamenávají rostoucí rezistenci mykotických infekcí k antimykotikům, stejně tak i k tetracyklinům (patrně v souvislosti s podáváním antibiotik jatečným zvířatům).

- Dr. Stumpfová uvedla dotaz na výskyt niklu ve svorkách používaných při cholecystektomii (podobný případ ohl. obsahu niklu v náhradě byl diskutován na minulém zasedání u kardiologické operace foramen ovale). Pracovní skupina je toho názoru, že vždy existuje adekvátní náhrada bez obsahu niklu.
- Dr. Žemličková a dr. Novák uvedli další případy pacientů s kontaktním ekzémem při senzibilizaci na PPD po malování hennou na dovolené. Dr. Novák prezentoval silnou bulózní alergickou reakci na PPD v rámci následně provedeného epikutánního testu u dotyčného pacienta.
- Dr. Novák vznesl otázku sdílení zkušeností v rámci léčby chronické spontánní kopřivky CSU (především s biologickou léčbou omalizumabem), neboť řada kolegů naší pracovní skupiny se touto problematikou zabývá. Uvedl mj. dva případy chronické indukovatelné (dermografické) kopřivky refrakterní k léčbě H1 antihistaminiky 2. generace ve 4 násobné dávce, u nichž není indikace k zahájení biologické léčby. Dr. Janatová uvedla svou zkušenost s léčbou omalizumabem na jejím pracovišti, kdy nejdelší léčby byla 7 léčebných cyklů a u 59% pacientů dojde po ukončení 1. cyklu (tedy po 6 měsících léčby) k relapsu CSU.
- Dr. Stumpfová vznesla dotaz na délku pracovní neschopnosti při šetření nemoci z povolání.

Zapsal dr. Novák