

Sklíčkový seminář dermatopatologické pracovní skupiny ČDS ČLS JEP

8.10.2025

prof. MUDr. Jiří Štork, CSc., VFN

- atypický fibroxantom
- maligní atrofická papulóza
- melanom
- smíšený akrální melanocytární névus
- epiteloidní hemangiom/ALHE
- makulózní amyloidóza s leukocytoklastickou vaskulitidou
- dermatitis s dyskeratózou
- reaktivní hyperplazie či HPV-indukovaná podnehtová léze s přítomností amyloidu
- balanitis
- susp. metastáza karcinomu z Merkelových buněk
- subkutánní sarkoidóza
- lupus erythematosus s lichenoidními rysy
- carcinoma in situ – VIN3
- SSM se satelitní metastázou
- aktinická keratóza se sekundární amyloidózou
- lentigo solaris v asociaci s histiocytomem

doc. MUDr. Lumír Pock, CSc., Bioptická laboratoř s.r.o.

- keratosis actinica ve stěně epidermoidní cysty
- lupus erythematosus subacutus
- akantom z jasných buněk
- lichen sclerosus et atrophicus na prepuciu se sekundárním verukózním karcinomem
- mongolská skvrna
- warty dyskeratoma
- ekrinní porom
- lichen planus mucosae – pigmentosus
- syphilis maligna
- kombinovaný névus – névocelulární a modrý
- fibrofolliculoma
- infiltrativně rostoucí basaliom
- supraoseální otlak

- desmoplastický trichoepitheliom

MUDr. Miroslav Důra, Ph.D., Bioptická laboratoř s.r.o.

- prurigo pigmentosa
- metastáza adenokarcinomu do kůže, dle metylační analýzy origo jícen/žaludek
- sebaceom, BCC a syringocystadenoma papilliferum v terénu naevus sebaceus
- sebaceózní adenom
- suspektní kolize nebulózního/prebulózního pemfigoidu a morbus Hailey-Hailey
- lichen aureus či posttraumatická léze
- porphyria cutanea tarda či pseudoporfyrie
- folikulárně vázaná tinea charakteru ectothrix