

Sklíčkový seminář dermatopatologické pracovní skupiny ČDS ČLS JEP

16.9.2026

MUDr. Katarína Kuťková, FNMH

- kombinovaná melanocytární léze – modrý névus a WNT-aktivovaný hluboko penetrující melanocytom
- bulózní pemfigoid
- nádor z granulárních buněk
- metastáza melanomu v axile

MUDr. Jakub Kovářík, FNMH

- trichoepiteliom
- dermatitida s psoriaziformními rysy
- WNT-aktivovaný hluboko penetrující/plexiformní melanocytom
- scabies
- Pagetova choroba vulvy

prof. MUDr. Jiří Štork, CSc., VFN

- světlobuněčný syringom
- PeIN – HPV asociovaný
- pseudoepiteliomatózní hyperplazie
- sarkoidóza s objemnými granulomy
- komedo při akné
- obliterující vaskulopatie
- cizí těleso – Gelaspon
- subunguální verukózní hyperplazie
- CD30 pozitivní lymfoproliferace
- rosacea kštice
- carcinoma in situ versus klonální seboroická keratóza
- GVHD – TEN-like
- neutrofilní urtikariální dermatóza
- cévní ektazie
- ekrinní porom a sebaceom
- pseudoepiteliomatózní hyperplazie
- ekrinní porom

- keratoakantom či SCC

doc. MUDr. Lumír Pock, CSc., Bioptická laboratoř s.r.o.

- velkobuněčný akantom
- WNT-aktivovaný hluboko penetrující melanocytom
- leukocytoklastická vaskulitida či livedoidní vaskulopatie
- Spitzové melanocytom s *ROS1* fúzí
- nádor z dermálních ductů
- trichoblastom s melaninem
- fenotypicky heterogenní dermální melanocytární léze (intradermální a modrý névus)
- WNT-aktivovaný hluboko penetrující melanocytom
- ekrinní porom

MUDr. Miroslav Důra, Ph.D., Bioptická laboratoř s.r.o.

- poroidní hidradenom
- hidradenoma papilliferum s oxyfilní metaplazií
- adenodermatofibrom
- pravá léze Spitzové s rysy dysplastického névu s prokázanou fúzí *MYO5A::NTRK3*
- lichen amyloidosus
- mikrovenulární hemangiom
- Rosai-Dorfmanova choroba
- folikulární lymfom
- leiomyom se ztrátou exprese fumarát hydratázy
- nodulární fasciitida se zlomem *USP6*
- superficiální tinea
- infiltrativní bazocelulární karcinom