Ze zasedání výboru ČDS 19.11. 2026 přinášíme aktuality z lékové agendy pro praxi:

Triamcinolon E ung. - příčinou výpadku je celosvětově nedostupný kloroxin (proto i nedostupnost LP Endiaron tbl.). Tudíž nelze zajistit dodávky kloroxinu, a nelze proto vyloučit ani trvalé ukončení dodávek Triamcinolon E. Kloroxin není již dostupný ani jako surovina pro IPLP. Alternativně lze použít pro magistraliter preskripci starší hydroxychinolinový derivát kliochinol (původně obsažený v Triamcinolonu E, z bezpečnostních důvodů nahrazený před lety kloroxinem). Rozpisy pro IPLP externa s kliochinolem lze dohledat v publikaci Sklenář Z. Magistraliter preskripce v dermatologii, příp. na webu www.iplprecept.cz. Doba použitelnosti a cena IPLP se budou pochopitelně od HVLP Triamcinolonu E ung. zásadně lišit. To se týká i bezpečnosti: kliochinol při penetraci kůží a resorpci do krve může způsobovat endokrinní disrupce (thyreopatie pro obsah jodu) a je potenciálně neurotoxický (SMON- subakutní myelopatická neuropatie při p.o. požití). Měl by se tedy používat jen na malé plochy (resorpce), a spíše krátkodobě (kumulace). Neměl by se používat u dětí pod 2 roky a s max. opatrností u malých dětí, osob s thyreopatií či závažnějšími nefro- anebo hepatopatiemi. Kliochinol patří ke známým kontaktním alergenům.

Batrafen sol. - důvodem výpadku jsou nevyhovující výsledky validačních šarží od nového výrobce (nový potenciální výrobce již nalezen). Nedostupnost je nahlášena do 2.1. 2029. U Batrafenu ve formě krému se výpadky neočekávají. Možná je magistraliter příprava roztoku s ciklopiroxolaminem (www.iplprecept.cz). Doba použitelnosti a cena IPLP se budou pochopitelně od HVLP Batrafenu sol. zásadně lišit.

Zineryt sol.- výpadek trvá, důvodem je nedostupnost erytromycinu u výrobce. Nahlášeno je do 10.1. 2028, ale obnovení je nejisté. Náhrada přípravkem Aknemycin sol. není vždy možná či vhodná - potenciální problematické tolerance, zejm. u atopiků a obecně u pacientů se sensitivní či intolerantní kůží; potenciálně nižší účinnost (2% *vs.* 4% erytromycin), malá gramáž a vyšší cena. Určitou alternativou je IVLP příprava 4% erytromycinového roztoku, která má ale svá úskalí (kompatibilita, iritabilita, expirace, cena aj.). V terénu kolují různé i problematické rozpisy. Proto bude doporučená receptura IVLP alternativy Zinerytu a dalších možností rozpisu erytromycinového roztoku zpracovaná v podobě článku v Čs. Dermatologii odborníkem na farmakotechnologii.

Pendepon comp. - je v ČR opět na trhu (BB Pharma a.s.). Společně s ostatními OS ČLS JEP apelujeme na SÚKL k urychlení procesu stanovení úhrady ze ZP.